



PIRMSANESTĒZIJAS PACIENTU APTAUJAS UN INFORMĀCIJAS LAPA STACIONĀRĀ

Es _____ saprotu, ka anestēzija ir nepieciešama,
pacienta vai par pacientu atbildīgās personas vārds

lai mans ārsts varētu veikt ķirurģisku / diagnostisku procedūru.

Man ir paskaidrots, ka visi anestēzijas veidi saistīti ar zināmu risku un nav iespējams garantēt anestēzijas rezultātu. IR IESPĒJAMAS RETAS, NEGAIĀDĪTAS ANESTĒZIJAS KOMPLIKĀCIJAS, TĀDAS KĀ INFEKCIJA, ASIŅOŠANA, ZĀĻU NEPANESĪBA, TROMBOZES, JUŠANAS TRAUCĒJUMI, LOCEKĻU FUNKCIJAS TRAUCĒJUMI, PARALĪZE, SMADZEŅU BOJĀJUMS, SIRDS LĒKME VAI PAT NĀVE. Es saprotu, ka tas attiecas uz VISIEM anestēzijas veidiem, bet tabulā minētie riski attiecas uz konkrētiem anestēzijas veidiem. Es saprotu, ka anestēzijas veida izvēli nosaka vairāki faktori, to vidū mans veselības stāvoklis, plānotās procedūras raksturs, ārsta izvēle un mana vēlēšanās. Pastāv iespēja, ka izvēlētais anestēzijas veids var daļēji vai pilnīgi neizdoties un tāpēc jāizmanto cita anestēzija. Es piekrītu, nepieciešamības gadījumā, cita anestēzijas veida izmantošanai pēc anesteziologa izvēles,

izņemot _____ anestēzijas veids

Manas anestēzijas laikā var tikt izmantoti viens vai vairāki no minētajiem anestēzijas veidiem:

Vispārējā anestēzija	Gaidāmais rezultāts	Pilnīgs apziņas, sāpju sajūtas zudums
	Tehnika	Zāļu ievade organismā vēnā vai caur elpošanas ceļiem, iespējama speciālas caurules ielikšana elpošanas ceļos
	Risks	Mutes, rīkles, žokļu sāpīgums, balss aizsmakums, zobu un mutes trauma, asinsvadu bojājums, vemšana, aizrīšanās, plaušu karsonis, nepilnīgs miegs
Spinālā, epidurālā tehnika	Gaidāmais rezultāts	Ķermeņa daļas jušanas un kustību pārejošs zudums
	Tehnika	Zāļu ievade caur adatu vai katetru cerebrospinālā anestēzijas šķidrumā vai epidurālā telpā
	Risks	Galvassāpes, sāpes mugurā, džinkstoņa ausis, krampji, infekcija, nepārejošs muskuļu vājums, tirpšana, atlieku sāpes, asinsvada bojājums, paralīze
Vadu anestēzija	Gaidāmais rezultāts	Ķermeņa daļas jušanas un kustību pārejošs zudums nervu darbības zonā
	Tehnika	Zāļu ievade blakus nervam, kas inervē operācijai nepieciešamo zonu
	Risks	Infekcija, krampji, vājums, nepārejoša tirpšana, atlieku sāpes, asinsvada bojājums
Intravenozā reģionālā anestēzija	Gaidāmais rezultāts	Locekļa jušanas un kustību pārejošs zudums
	Tehnika	Zāļu ievade organismā rokas vai kāju vēnā zem žņauga uzlikšanas vietas
	Risks	Infekcija, krampji, vājums, nepārejoša tirpšana, atlieku sāpes, asinsvada bojājums
Procedūras, kas noteik anesteziologa klātbūtnē ar sedāciju	Gaidāmais rezultāts	Sāpju un satraukuma mazināšanās, daļējs samaņas zudums
	Tehnika	Zāļu ievade organismā vēnā vai caur elpošanas ceļiem
	Risks	Pilns samaņas zudums, elpošanas nomākums, asinsvada bojājums
Procedūras, kas noteik anesteziologa klātbūtnē bez sedācijas	Gaidāmais rezultāts	Organisma dzīvībai svarīgo orgānu funkciju novērošana
	Tehnika	Organisma dzīvībai svarīgo orgānu funkciju novērošanas aparatūras pievienošana
	Risks	Satraukums, bailu sajūtas, diskomforta pieaugums

Es apliecinu, ka esmu iepazinies ar šo dokumentu, saprotu dažādu anestēzijas metožu iespējas un riskus. Man ir bijusi iespēja noskaidrot nesaprotamos jautājumus. Piedāvātajam anestēzijas veidam piekrītu.

Datums _____

Pacienta vai par pacientu atbildīgās personas paraksts _____ Anesteziologa paraksts _____

**LŪDZU ATZĪMĒJIET AR «+» JŪSU ATBILDI UZ KATRU JAUTĀJUMU.
JA JŪS NESAPROTAT JAUTĀJUMU VAI NEVARAT PRECĪZI ATBILDĒT, LIETOJIET «?».**

Jūsu vecums:	Augums:	Svars:
--------------	---------	--------

Vai Jums ir bijušas vai ir pašlaik:	jā	nē	Piezīmes	Vai Jums ir bijušas vai ir pašlaik:	jā	nē	Piezīmes
Saaukstēšanās pēdējo 2 nedēļu laikā				Vairogdziedzera slimības			
Bronhiālā astma, hronisks bronhīts				Glaukoma (paaugstināts acs iekšējais spiediens)			
Tuberkuloze				Grūtniecība (pašlaik)			
Smēķēšana (cigarešu skaits dienā)				Smadzeņu asinsrites traucējumi, insults (trieka), galvas traumas			
Sirds slimības (sirds kaite, stenokardija, miokarda infarkts...)				Operācijas (kādas un kad, kādā anestēzijā)			
Sirds aritmijas				Sarežģījumi iepriekšējo anestēziju laikā			
Augsts asinsspiediens				Asins pārliešana un tās sarežģījumi			
Elpas trūkums, tūskas				Alerģiskas reakcijas, medikamentu nepanesība			
Muskuļu vājums, miastēnija, poliomiēlīts				Zobu protēzes, kontaktlēcas			
Vispārēji krampji, epilepsija				Apgrūtinātas galvas kustības, grūti atvērt muti			
Nieru slimības				Paplašinātas apakšstilbu vēnas, tromboflebīti (vēnu iekaisumi)			
Kuņģa, 12-pirkstu zarnas saslimšanas				Psihiskas saslimšanas			
Žults pūšļa saslimšana				Alkoholisms, narkomānija, toksikomānija			
Dzelte, hepatīts				Citas saslimšanas			
Cukura diabēts				Medikamenti, ko lietojat regulāri			

**PIRMSANESTĒZIJAS APTAUJAS UN INFORMĀCIJAS LAPA
AMBULATORIEM SLIMNIEKIEM UN VIENAS DIENAS STACIONĀRĀ**

Cienijamo pacient!

Vispārējā anestēzija (narkoze) aizsargā no sāpju un operācijas stresa nevēlamās ietekmes uz jūsu organismu, kā arī rada nepieciešamos apstākļus operācijas veikšanai. Sākot narkozi, jūs tiksiet iemidzināts, tiks nodrošināta jūsu elpošanas ceļu caurlaidība un pastāvīga pieeja jūsu asinsritei (vēnā tiek ievadīta kanīle), tiks novērotas dzīvībai svarīgās funkcijas: elpošana, sirdsdarbība, asinsspiediens. Ja būs nepieciešams, pirms operācijas vai tās laikā, tiks veikti ārstnieciski pasākumi, kas atvieglos jūsu stāvokli pēc operācijas (pretsāpju, prettūskas, antibakteriālā terapija). Operācijai beidzoties, jūs tiksiet pamodināts, un līdz jūsu mājās iešanai par jums rūpēsies mūsu personāls. Parasti operācijas ilgums dienas stacionārā nepārsniedz 1 stundu, un pacients var doties mājās tajā pašā dienā. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja palikt stacionārā.

Pirms apmeklējuma:

Viena no visbīstamākajām komplikācijām ir kuņģa satura nokļūšana elpošanas ceļos. Lai padarītu šo komplikāciju maz iespējamu, operācijas dienas rītā **neēdiet un nedzeriet**. Ja operācija paredzēta pēcpusdienā (pēc plkst. 13), plkst. 7 no rīta varat ieturēt vieglas brokastis (tikai šķidru barību: tēju, jogurtu - 200 ml pieaugušam). Aizliegts ēst cietu barību 6 stundas pirms operācijas.

Noteikti organizējiet sev pavadoni, kas palīdzēs jums nokļūt mājās pēc procedūras. Pirms apmeklējuma notīriet nagu laku, kosmētiku. Brīdiniet ārstu, ja jums ir zobu protēzes vai kontaktlēcas. Noņemiet rotaslietas.